

## Patientkort – Apixaban Reddy

**Detta kort ska alltid finnas med dig, barnet eller vårdnadshavaren.**

**Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för all annan sjukvårdspersonal före behandling.**

**Jag behandlas med apixaban, ett antikoagulantium för att förhindra blodproppar.**

Vänligen fyll i detta avsnitt eller be läkaren att göra det:

Namn: \_\_\_\_\_

Födelsedatum: \_\_\_\_\_

Indikation: \_\_\_\_\_

Vikt: \_\_\_\_\_

Dos: \_\_\_\_\_ mg två gånger dagligen

Läkarens namn: \_\_\_\_\_

Läkarens telefonnummer: \_\_\_\_\_

### Information till patienter/vårdnadshavare

- Ta/ge apixaban regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en morgondos, ta/ge den så snart du kommer ihåg och den kan tas/ges tillsammans med kvälldosen. En missad kvälldos kan endast tas/ges under samma kväll. Ta/ge inte två doser nästa morgon, utan fortsätt följande dag med rekommenderad dosering två gånger dagligen enligt doseringsschemat.
- Sluta inte ta/ge apixaban utan att rådfråga läkaren, eftersom du/patienten riskerar att få en stroke, blodpropp eller andra komplikationer.
- Apixaban hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, sök omedelbart medicinsk vård.

- Om du/patienten är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du/patienten använder apixaban.

## Information till vårdpersonal

- Apixaban är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Apixaban kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixabanbehandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med apixaban kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringsstest rekommenderas inte) – se Produktresumé.
- Ett läkemedel för reversering av apixabans anti-faktor Xa-aktivitet finns tillgängligt för vuxna, men dess säkerhet och effekt har inte fastställts hos pediatriiska patienter (se produktresumén för andexanet alfa).